



## Vroeg signalering problemen na CVA/TIA

*huisarts/POH, wijkverpleegkundige, CVA-verpleegkundige | 1<sup>e</sup> jaar 3-4x, daarna 1-2x p.j.*

### Vragen patiënt

1. Hoe gaat het met het huishouden of met zelfverzorging? Heeft u hulp nodig?
2. Hoe gaat het met het doen van andere activiteiten zoals hobby's, werk, uitstapjes?
3. Heeft u last van vermoeidheid?
4. Komt het wel eens voor dat u somber, angstig of emotioneel bent?
5. Bent u wel eens vergeetachtig? Of ervaart u moeite om uw aandacht ergens bij te houden of om 2 dingen tegelijkertijd te doen?
6. Hoe (makkelijk) gaat het met spreken, begrijpen van gesproken taal of lezen van een boek?
7. Heeft u andere lichamelijke problemen vanwege CVA/TIA (slikken, slapen, pijn, duizeligheid)?
8. En hoe is dat met vrijen of intimiteit? (meestal niet in 1<sup>e</sup> gesprek)

⇒ Is dit anders dan voordat u een CVA/TIA kreeg / de vorige keer?

⇒ Op welke momenten/wanneer speelt dit?

Maak gebruik van **screeningsinstrumenten** (zie ommezijde)

### Vragen naaste

1. Hoe gaat het nu met uw naaste? (vraag naar karakter & bovenstaande problemen)
2. Hoe ervaart u de zorg voor de patiënt? Bent u overbelast?



	<b>Mogelijke screeningsinstrumenten (zie ook SIGEB)</b>
1. Huishouden/zelfzorg	Barthelindex, USERP2
2. Activiteiten	USERP2
3. Vermoeidheid	FSS-7
4. Emotie	CLCE24 (item 14-21)
5. Aandacht	CLCE24 (item 1-11)
6. Communicatie	CLCE24 (item 14-27)
7. Andere problemen	-
8. Intimiteit	
Belasting mantelzorger	CSI

Bij problemen én ontbrekende expertise op betreffend domein, tijdig doorverwijzen